Descriptions de Coléoptères Hétéromères et Malacodermes nouveaux recueillis dans l'Angola par la Mission Rohan-Chabot (1919),

par M. Maurice Pic.

Malacodermes.

Lampyris Rohani nov. sp.

Angustatus, fere opacus, pallido-testaceus, capite, thorace in disco postice elytrisque nigro-piceis, his pallido marginatis.

Long. : 6-8 millimètres.

Étroit, presque opaque, testacé pâle avec la tête, une macule discale postérieure au prothorax et les élytres d'un noir de poix ou grisâtre; membres et abdomen parfois en partie et vaguement rembrunis. Yeux grands; prothorax pas très long, un peu rétréci en arrière, subarqué et faiblement angulé au milieu en avant, plus ou moins noir sur le disque en arrière et subsillonné-impressionné en avant, au milieu orné en partie d'une ponctuation granuleuse; écusson long, un peu tronqué au sommet; élytres un peu plus larges que le prothorax, assez longs, ornés de côtes qui s'effacent aux extrémités, foncés et étroitement bordés de testacé pâle; segments de l'abdomen peu prolongés sur les côtés; pygidium un peu échancré de chaque côté, dernier segment abdominal sinué et un peu échancré au milieu.

La var. *diversicollis* n'a pas le prothorax angulé sur son milieu antérieur, il est peu impressionné en avant et présente une sorte de carène antérieure.

Angola (Muséum de Paris et coll. Pic).

Peut se placer près de *L. longicollis* E. Ol., de forme plus étroite avec le prothorax différent et les segments abdominaux peu prolongés sur les côtés en arrière.

Luciola tetrasticta var. nov. **brevemaculata.**

Thorace pallido, postice breve nigro maculato, abdomine testaceo, elytris testaceis, in disco pro parte obscuris.

Angola (Muséum de Paris).

Selasia Chaboti nov. sp.

Parum elongata, nitida, testacea, elytris postice late nigris.

Long.: 5-7 millimètres.

Peu allongé, brillant, testacé avec les élytres largement noirs postérieurement. Tête avec les yeux à peu près de la largeur du prothorax, excavée en avant, antennes pas très longues, longuement flabellées, à troisième article long, muni au milieu d'un long appendice ramiforme; prothorax transversal, droit sur les côtés, éparsément ponctué, angles postérieurs saillants, muni d'une carène (ou d'un pli) latérale, oblitérée en avant; écusson grand, triangulaire; élytres peu plus larges que le prothorax, pas très longs, subparallèles, courtement rétrécis à l'extrémité, irrégulièrement ponctués avec quelques traces de stries, la coloration testacée, triangulairement disposée sur la base, se prolonge étroitement sur la suture; pattes assez robustes.

Angola (Muséum de Paris et coll. Pic).

Voisin de *S. Auberti* Pic, prothorax plus droit sur les côtés et muni d'une carène latérale et troisième article des antennes non triangulaire.

Hétéromères.

Synallecula Rohani nov. sp.

Long.: 8 millimètres.

♀ *Major, oblongo-elongata, depressa, luteo sat sparse pubescens, rufa, oculis et antennis apice nigris, tibiis subarcuatis.*

Grand, oblong-allongé, déprimé, orné d'une pubescence jaunâtre assez espacée, roux avec les yeux et les antennes largement noirs à l'extrémité. Tête assez grosse, en partie densément ponctuée, épistome tronqué en avant et bordé de jaune, yeux très écartés; antennes longues et grêles; prothorax en demi cercle, très rétréci en avant, déprimé, un peu impres-

sionné devant l'écusson, peu fortement et densément ponctué sauf sur le milieu antérieur, angles postérieurs émoussés; écusson grand, subtriangulaire, à ponctuation peu écartée; élytres à peine plus larges que le prothorax, assez longs, atténués postérieurement, à faible impression postscutellaire, finement striés, les stries en partie effacées en avant, avec les intervalles déprimés ayant plusieurs rangées de points; pattes assez courtes, cuisses un peu épaissies, tibias faiblement arqués.

Angola (Muséum de Paris).

Espèce très distincte par sa grande taille jointe à sa forme non parallèle.

Notoxus cucullatus var. nov. **Rohani.**

Satis robustus, capite thoraceque in disco late nigris, illo robustissimo, elytris piceis, antice late et postice breve testaceo maculatis.

Angola (Muséum de Paris).

Anthicus (Aulacoderus) Chaboti nov. sp.

Oblongus, nitidus, niger, mediocre griseo pubescens.

Long.: 3 millimètres.

Oblong, brillant, modérément pubescent de gris, entièrement noir. Tête large, subtronquée postérieurement, antennes assez longues et grêles, à quatre derniers articles un peu épaissis, terminal peu long; prothorax assez court, fortement élargi-subanguleusement en avant, à sillon transversal, assez rapproché de la base; élytres subovalaires, fortement rétrécis postérieurement, un peu dentés au sommet, à ponctuation fine et rapprochée, épaules arrondies; pattes assez grêles.

Angola (Muséum de Paris et coll. Pic).

Voisin de *A. Achillei* Pic, en diffère par la forme plus trapue, les épaules bien arrondies et la coloration générale noire.